



Το έργο **LIFE ARCPROM** (LIFE18 NAT/GR/000768) έχει στόχο τη βελτίωση της συνύπαρξης ανθρώπου - αρκούδας σε τέσσερα Εθνικά Πάρκα της Ν.Ευρώπης, τρία στην Ελλάδα και ένα στην Ιταλία. Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 και θα έχει διάρκεια 5 χρόνων. Εταίροι του έργου είναι τέσσερα Εθνικά Πάρκα (Πρεσπών, Β.Πίνδου, Οροσειράς Ροδόπης και Maiella), δύο πανεπιστήμια (της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας) και δύο περιβαλλοντικές οργανώσεις (Καλλιστώ και WWF Ιταλίας). Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ, το Πράσινο Ταμείο και ίδιους πόρους των εταίρων, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 2.786.497€.



LIFE ARCPROM



ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΥΟΜΟ
HUMAN

ΑΡΚΟΥΔΑ
ORSO
BEAR

1/4



www.lifearcprom.uowm.gr/



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΥΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ



ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ

Τα συχνότερα συμπτώματα που εμφανίζονται σε σκύλο που έχει υποστεί δηλητηρίαση είναι:

- Έλλειψη συντονισμού των κινήσεων και απροθυμία για μετακίνηση
- Έντονος μυϊκός τρόμος που μπορεί να εμφανίζεται σε ένα μόνο σημείο του σώματος ή να είναι γενικευμένος
- Έκκριση υπερβολικής ποσότητας σάλιου (σιελόρροια)
- Αυξημένος αναπνευστικός ρυθμός (ταχύπνοια) και κοιλιακή αναπνοή (δύσπνοια)
- Συνεχόμενοι έμετοι και πιθανόν διάρροια
- Επιληπτικές κρίσεις που συνοδεύονται από ολιγόλεπτη απώλεια συνείδησης

Οι ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω αποτελούν τις **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ** που πρέπει να δοθούν **ΑΜΕΣΑ** στο σκύλο, με την υποψία δηλητηρίασης. Σε καμία περίπτωση τα παρακάτω φάρμακα δεν υποκαθιστούν την κατάλληλη θεραπεία για τη δηλητηρίαση του σκύλου, η οποία μπορεί να δοθεί **ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ** από Κτηνίατρο. Για το λόγο αυτό, η χορήγηση των φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται σε επικοινωνία με Κτηνίατρο κι αμέσως μετά ο σκύλος να μεταφέρεται στο πλησιέστερο Κτηνιατρείο.

- Πριν τη χορήγηση οποιουδήποτε φαρμάκου που περιέχεται στο κυτίο θα πρέπει να διαβαστούν **ΟΛΕΣ** οι πληροφορίες που περιέχονται στο Φύλλο Οδηγιών.
- Σε περίπτωση που ο σκύλος εμφανίζει επιθετική συμπεριφορά **ΔΕΝ** θα πραγματοποιείται καμία προσπάθεια χορήγησης των φαρμάκων, για την αποφυγή ατυχήματος.
- Η διάνοιξη των φιαλιδίων γίνεται με σπάσιμο του λαιμού του φιαλιδίου, ασκώντας πίεση με τον αντίχειρα πάνω στη λευκή τελεία που υπάρχει στο φιαλίδιο.

ΒΗΜΑ 1	Εφαρμόζονται τα γάντια μίας χρήσης που περιέχονται στο κουτί
---------------	--

ΒΗΜΑ 2	Χορήγηση ΑΤΡΟΠΙΝΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ)			
	*Η χορήγηση ατροπίνης είναι ανεξάρτητη από το χρόνο κατανάλωσης του δηλητηρίου κι από την πρόκληση ή όχι εμετού στο σκύλο.			
	**Η απαραίτητη ποσότητα ατροπίνης χορηγείται με ενδομυϊκή ένεση στην περιοχή του μηρού (μπούτι).			
	Συνολικό Βάρος σκύλου	Συνιστώμενη Δόση	Συνολικό Βάρος σκύλου	Συνιστώμενη Δόση
	10 κιλά	Μισή αμπούλα	30 κιλά	2 αμπούλες
15 κιλά	Μία αμπούλα	35 κιλά	2 αμπούλες	
20 κιλά	Μία αμπούλα	40 κιλά	2 αμπούλες	
25 κιλά	Μία αμπούλα	>40 κιλά	3 αμπούλες	
**Σε περίπτωση που δεν βελτιωθεί η κλινική εικόνα του σκύλου εντός 15 λεπτών από την αρχική χορήγηση ατροπίνης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια δεύτερη χορήγηση με δόση τη μισή από την πρώτη.				

ΒΗΜΑ 3	Χορήγηση ΑΠΟΜΟΡΦΙΝΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΣΚΟΥΡΟΧΡΩΜΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ)			
	*Η πρόκληση εμετού στο σκύλο επιτρέπεται ΜΟΝΟ εάν ο σκύλος διατηρεί τις αισθήσεις του.			
	**Η πρόκληση εμετού στο σκύλο εφαρμόζεται ΜΟΝΟ όταν είναι γνωστή η ώρα κατάποσης του δηλητηρίου και δεν έχουν περάσει περισσότερες από 2 ώρες από την κατάποση.			
	***Η απομορφίνη χορηγείται με υποδόρια (κάτω από το δέρμα) ένεση στην περιοχή του τραχήλου (αυχένα).			
	Συνολικό Βάρος σκύλου	Συνιστώμενη Δόση	Συνολικό Βάρος σκύλου	Συνιστώμενη Δόση
10 κιλά	Μισή αμπούλα	30 κιλά	Μία αμπούλα	
15 κιλά	Μισή αμπούλα	35 κιλά	Μία αμπούλα και μισή	
20 κιλά	Μία αμπούλα	40 κιλά	Μία αμπούλα και μισή	
25 κιλά	Μία αμπούλα	>40 κιλά	2 αμπούλες	

ΒΗΜΑ 4	Χορήγηση ΧΑΠΙΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ			
	*Ο ενεργός άνθρακας μπορεί να δίδεται επικουρικά, καθώς δεσμεύει κάποιες (όχι όλες) από τις τοξικές ουσίες που χρησιμοποιούνται συχνά ως δηλητήρια.			
	**Τα χάπια θα πρέπει να χορηγούνται μετά την πρόκληση εμετού στο σκύλο.			
	*** Τα χάπια θα πρέπει να χορηγούνται ΜΟΝΟ σε σκύλους που διατηρούν τις αισθήσεις τους και ΔΕΝ εμφανίζουν δύσπνοια, ταχύπνοια, σύγχυση ή και επιθετικότητα.			
	Συνολικό Βάρος σκύλου	Συνιστώμενη Δόση	Συνολικό Βάρος σκύλου	Συνιστώμενη Δόση
10 κιλά	1 χάπι	30 κιλά	4 χάπια	
15 κιλά	2 χάπια	35 κιλά	4 χάπια	
20 κιλά	2 χάπια	40 κιλά	5 χάπια	
25 κιλά	3 χάπια	>40 κιλά	5 χάπια	

ΒΗΜΑ 5	ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ: Γιαννακόπουλος Αλέξιος: 6972609779 Χατζόπουλος Δημήτριος: 6936689152
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής: Καλογήρου Γιώργος 23850 46085, 6983717152